109年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試、109年專門職業及技術人員高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

代號:2106 頁次:6-1

等	别	:	高等考試
類	科	:	護理師

科 目:基本護理學(包括護理原理、護理技術)與護理行政

考試時間:1小時 座號:

※注意:(→本試題為單一選擇題,請選出<u>一個正確或最適當的答案,複選作答者,該題不予計分</u>。

(二)本科目共80題,每題1.25分,須用<u>2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記,於本試題上作答者,不予計分。</u>

(三)禁止使用電子計算器。

1 有關因應壓力處理方法之敘述,下列何者錯誤?

(A)降低產生壓力的情境,可利用不斷變化病室布置,以減少對壓力情境的注意力

(B)改善心理對壓力的反應,可尋求支持系統協助

(C)降低產生壓力的情境,可訂出工作優先順序

(D)降低身體對壓力的反應,可安排規律運動使身體放鬆、減少壓迫感

2 有關巴斯德消毒法之敘述,下列何者正確?

(A)常用在牛奶、果汁飲品的消毒

(C)無法殺死真菌類微生物

(B)以 62℃加熱 15 分鐘,可達高層次消毒

(D)屬於一種生物抑菌劑消毒法

3 照護 H5N1 流感病毒感染的病人時,在穿戴各項個人防護措施時,下列何者錯誤?

(A)脫下隔離衣時,領口被視為清潔區

(C)護目設備須於前室中脫除

(B)隔離衣要重複使用時,掛置時污染面應朝外

(D)外科手術口罩應每8小時更換一次

4 有關化學消毒法之敘述,下列何者錯誤?

(A) 70~75%的酒精殺菌效果比 95%酒精效果好

(C) 化學消毒劑時間越長殺菌程度越高

(B) 5.25%的漂白水對肝炎病毒的消毒無效

(D)每升高 10℃化學消毒劑殺菌度增加一倍

5 對於醫囑(order)的描述,下列何者正確?

(A) S.O.S 醫囑超過 8 小時,此醫囑自動失效

(B)當醫囑出現 order renew 表示以上的醫囑有效,以下的醫囑無效

(C)新進護理師三個月後才可以接受口頭醫囑

(D)接受口頭醫囑最好有二位護理師在場確認

6 病歷的生命徵象紀錄表中不會出現下列何種資料?

(A)病人基本資料

(B)手術或生產日期

(C)特殊處置

(D)病況推展

7 有關 S.O.A.P.I.E. (subjective data, objective data, assessment, plan, implementation, evaluation) 與 D.A.R.T. (data, action, response, teaching) 焦點紀錄法之敘述,下列何者錯誤?

(A) S.O.A.P.I.E.中的「S.O.」相當於焦點紀錄法的「D.」

(B) S.O.A.P.I.E.中的「A.」相當於焦點紀錄法的「T.」

(C) S.O.A.P.I.E.中的「E.」相當於焦點紀錄法的「R.」

(D) S.O.A.P.I.E.的「I.」相當於焦點紀錄法的「A.」

8 有關使用熱水袋之敘述,下列何者正確?

(A)意識不清病人的適用溫度約為 40.5~46.1℃

(B)使用時間以一小時為宜

(C)熱水袋貼放於皮膚後再放置橡皮治療巾,以減緩熱度散失

(D)留少許空氣於熱水袋內,以減緩熱度散失

9 有關需要更換存留導尿管情況之敘述,下列何者正確?①尿液 pH 值呈弱酸性 ②尿道分泌物有異臭味 ③出現絮狀沉澱物,致引流不暢 ④導管更換時間依材質而定 ⑤病人有尿液渗漏情形

(A) 1 2 3 4

(B)(2)(3)(4)(5)

(C)(1)(3)(4)(5)

(D)(1)(2)(3)(5)

10 孫先生昨天開始解尿不順、尿道灼熱感,臉色發紅、皮膚溫暖乾燥,生命徵象:血壓 126/76 mmHg、體溫 39.2℃(耳溫)、脈搏 116 次/分、呼吸 26 次/分,孫先生出現發燒現象,下列護理措施何者不適當?

(A)指導病人減少外在覆蓋物

(B)提供液體以補充無感水分散失

(C)指導多下床活動

(D)協助進行尿液檢驗

代號:2106

頁次:6-2 11 有關呼吸特性之敘述,下列何者正確? (A)內呼吸又稱為肺呼吸 (B)吸氣時內肋間肌收縮 (C)呼氣時肋骨下降 (D)吸氣時橫膈膜放鬆 12 沾到病人血液的傷口紗布,應依下列何種廢棄物規定處理? (B) 感染性可燃 (A)一般性可燃 (C)一般性不可燃 (D) 感染性不可燃 13 醫療廢棄物之收集處理方式,下列何者錯誤? (A)非有害藥用的 ampule 和 vial 瓶,需以白色透明塑膠袋收集 (B)手術後手套、紗布、排泄用具,需以藍色透明塑膠袋收集 (C)病人使用過後的胸腔引流瓶及引流管,棄置於標有感染性廢棄物之紅色容器 (D)空針及針頭,棄置於標有感染性廢棄物之黃色安全容器 14 有關病歷的注意事項及保存之敘述,下列何者正確? (A)病人可自行攜帶病歷至檢查室進行檢查 (B)護理師可依據病歷內容向病人解釋病情 (C)電子病歷須至少保存七年 (D)醫療人員,可依研究需求自行調閱病歷 15 下列何者不是主責護理 (primary nursing) 之特性? (A)提供個別性護理 (B)提供功能性護理 (C)提供連續性護理 (D)提供整體性護理 16 下列護理評估,何者屬於客觀資料(objective data)? (A)病人:「我幾乎每小時上一次廁所」 (B)看護:「他每天晚上平均醒來 3~4 次」 (C)護理師:「病人說不喜歡下床活動」 (D)護理師:「病人右側胸管引流液呈淡紅色」 17 針對一位「營養狀況改變:營養少於身體需求」的病人,其護理目標之擬訂,下列何者最適當? (A) 5/29 提供高熱量高蛋白飲食 (B) 5/29 衛教家屬準備病人喜好之食物 (C) 5/29 病人體重達到理想範圍 (D) 5/29 病人能攝取 2,000 大卡熱量/天 18 林老先生主訴晚上睡不好,白天沒精神,護理師評估林老先生有「睡眠型態紊亂」的健康問題,有關 此健康問題的鑑定性特徵,下列何者錯誤? (A)晚上醒來 3 次 (B)病房太吵 (C) 日間常打瞌睡 (D) 反應遲鈍 19 下列何者為第一手資料來源? (A)病人:「我覺得胸悶、好痛呀!」 (B)照服員:「病人已經好幾天沒有解大便了。」 (C)護理師:「病人的臉色蒼白、冒冷汗。」 (D)家屬:「他已經三天沒有好好睡覺,害我晚上也沒睡。」 20 病人出院攜帶數種藥物回家,下列何者應置放於冰箱? (A) Brown Mixture Liquid (120 mL) /Bot (B) Neomycin Oint (28 gm) /Tube (D) Gentamicin Eye Drops (5 mL) /Bot (C) Bisacodyl (10 mg) /Supp 21 因自發性氣胸接受手術的男性病人,其BMI為 20 kg/m²,術後給藥Pethidine(Demerol)(50 mg/mL/amp) 40 mg I.M. q.4h. p.r.n. (if pain),下列敘述何者不適當? (A) 每次給藥劑量為 0.8 mL,採肌肉注射 (B) 背臀區是首選注射部位 (C)若疼痛,每間隔四小時給藥 (D)注射藥物前反抽針心,如有回血應拔除針頭 22 10 公斤幼兒給予 Cough Mixture B Syrup 0.25c.c./kg P.O. q.i.d.,其給藥器具及注意事項,下列何者正確? (A)以小藥杯給藥時,給藥劑量刻度對準液體兩側緣 (B)以小藥杯給藥時,給藥劑量刻度對準液體凸面 (C)以空針給藥,給藥劑量刻度對準針心前端黑色圈下緣 (D)以空針給藥,給藥劑量刻度對準針心前端黑色圈上緣 23 給藥之醫囑縮寫及其意義,下列何者正確? (C) 1 puff: 1 錠劑 (D) O.D.: 左眼 (A) **A.S.**: 左耳 (B) S.C.: 皮內注射 24 為一位二歲病童執行醫屬 Ofloxacin 5 gtts q.12h. A. D., 其給藥方式,下列何者正確?

25 有關冷熱應用部位及其相對身體反射區域的組合,下列何者錯誤?

(A)將左耳廓向下往後拉

(C)將右耳廓向上往後拉

(A)四肢:腦 (B)前額:鼻黏膜組織 (C)胸後區: 心臟 (D)後腰部:腎


(B)將左耳廓向上往後拉

(D)將右耳廓向下往後拉

					.0-3		
26				部皮膚發紅,此現象稱為:			
	(A) 反彈現象(reboun	d phenomenon)	®適應現象	(adaptation phenomenon) 應(consistant effect)			
	(C)交感性反應(cons	ensual response)	(D)持續性反	應(consistant effect)			
27	冷熱應用能量轉換原	理於人體散熱之情	境,下列何者正確?				
	(A)發燒時,減少病人	、被蓋,主要是利用	對流(convection)原理	I			
	(B)高溫環境中,人體	養籍擴張表面血管調	整體溫,主要是利用傳	導(conduction)原理			
	(C)寒流來襲時,運用	暖暖包協助提高體	溫,主要是利用輻射(radiation) 原理			
	(D)運動後,呼吸速率	逐快,水分散失增力	加以降溫,主要是利用	蒸發(evaporation)原理			
28	人體對於用熱所產生	的生理反應之敘述	,下列何者正確?①減	緩充血與腫脹 ②增加血液黏稠	度 ③		
	抑制炎症反應 ④增	加淋巴流動與白血	球機動性		_		
	(A) (1) (2)	(B) (3) (4)	(C)(1)(4)	(D)(2)(3)			
29			密輸液套管(microdri	p set)輸注,預計4小時將此剩	餘量輸		
	注完畢,點滴滴速應			1	21,713		
	(A) 50		(C) 100	(D) 125			
30	0.45% NaCl 靜脈輸達						
			(C)嚴重燒傷	(D)顱內壓過高			
31	· · · - ·		7 0	,下列立即措施,何者最適當?			
	(A)調慢點滴流速並抬高頭部 (B)停止輸液並抬高下肢 (D)調慢點滴流速並採右側臥						
	(C)停止輸液並採左側	旧人	D調慢點滴	流速並採右側臥			
32			吞服,主要是治療口腔				
-	(A)金黃色葡萄球菌						
33							
	林先生因意外造成頸椎受損、大小便失禁,有關尿失禁之護理措施,下列何者正確? (A)教導排尿刺激技巧,例如:重複輕敲恥骨上方						
	(B)每小時喝水 300 mL,每 3~4 小時進行排尿刺激						
	(C)當餘尿量少於 250						
	(D)教導會陰部凱格式						
34	林女士陽道手術後,靜脈留置針位於左前臂,護理師應如何協助林女士更衣?①先脫右側 ②先脫左側						
	③先穿右側 ④先穿						
	(A)(1)(3)		(C)(2)(3)	(D)(2)(4)			
35	0 0			~ ~	保持脊		
	柱彎曲				N 101 13 153		
	(A)(1)(2)	(B)(1)(3)	(C)(2)(4)	(D)(3)(4)			
36	為老年人執行床上沐			(2)			
	(A)以 50% 酒精擦拭尽						
	(B)不建議以清水擦拭	*****	=				
	(C)沐浴後建議使用乳		14. VIC				
	(D) 鼠蹊部同時塗抹嬰		减少摩擦				
37				才會中風,因此給予其穿四件衣	昭、 載		
51				屬拒絕,下列護理措施何者最為			
			い励め減少なり 予減少病人身上衣物				
	(B)給予病人使用爽身						
	(C)給予電扇調整室內						
	(D)以乾毛巾擦拭病人						
38	執行成人女性無菌導						
50			为同争正证: 为面→遠側小陰唇內面				
	**バカサルスリン河 下ノスバ						
	(B) 左回道昆管水毒汁	. 入約 12~15 mI 的					
	(B)存留導尿管水囊注	入約 12~15 mL的					

(D)存留導尿管應固定在大腿內側

代號:2106 頁次:6-4





代號:2106 頁次:6-6

