

等 別：高等考試

類 科：護理師

科 目：產兒科護理學

考試時間：1 小時

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
(三)禁止使用電子計算器。

- 1 王女士 30 歲，第一次懷孕，詢問有關人性化生產準備，下列護理師的回應何者較不適當？
 - (A)與產婦一起討論生產計畫
 - (B)多元友善的生產環境，是鼓勵家人參與分娩過程
 - (C)提供新生兒於產後立即第一次與產婦接觸
 - (D)醫院生產前會有禁食、灌腸、會陰切開等常規處置
- 2 有關嬰兒正確含乳的注意事項，下列護理指導何者正確？
 - (A)需下壓乳暈以免乳房壓到嬰兒鼻子造成缺氧
 - (B)通常上乳暈露出比下乳暈少
 - (C)以乳頭觸動嬰兒的嘴以利張口含乳
 - (D)吸吮到乳汁會發出嘖嘖聲
- 3 有關第二孕期母血唐氏症四指標 (quadruple test) 之檢測項目，下列何者錯誤？
 - (A)胎兒甲型蛋白 (AFP)
 - (B)非結合性雌三醇 (Unconjugated estriol, uE₃)
 - (C)β-人類絨毛膜性腺激素 (β-hCG)
 - (D)胎盤生長激素 (PlGF)
- 4 懷孕期間由於生理機能改變，使得藥物在孕婦體內的吸收、分布、代謝與排泄均有改變，下列敘述何者正確？
 - (A)潮氣容積量下降，使吸入性藥物的吸收減少
 - (B)藥物與白蛋白結合比例降低，肝臟對藥物的代謝能力增加
 - (C)腎絲球過濾率增加，藥物的代謝變慢
 - (D)胃排空加快胃酸分泌增加，藥物滯留腸胃道時間減少
- 5 有關產前胎兒生理活動評估，下列敘述何者正確？
 - (A)計分方式分為兩種，而滿分標準分為 8 分和 10 分
 - (B)若總分為 6 分，表示胎兒狀況良好可每週再重複做一次
 - (C)超音波觀察之項目，如呼吸運動、胎動、胎兒身體張力和羊水容積
 - (D)正常羊水容積是指兩相互垂直的平面羊水囊，直徑均小於 1 公分
- 6 有關妊娠期會陰按摩，下列敘述何者正確？
 - (A)藉由按摩減少會陰肌肉的延展性，以減少會陰撕裂傷
 - (B)可在妊娠 32~34 週開始按摩，每星期至少 3~4 次
 - (C)會陰按摩應是一種無菌措施，以防止胎兒受到感染
 - (D)按摩應避免觸及尿道口，過程中若有微熱感是異常現象
- 7 妊娠各時期的孕婦心理反應會因生理的改變而產生變化。第一妊娠期婦女的心理反應，下列敘述何者最適當？
 - (A)憂喜參半的矛盾心理
 - (B)接受懷孕事實
 - (C)準備新角色
 - (D)身體界限的改變

- 8 李女士月經週期約 28~45 天，產前門診剛確定懷孕，最後一次月經來是上個月 3 號，下列何者為最準確的預產期推估法？
(A)用最後一次月經（LMP）日期，以內格來氏法推估
(B)詢問其最可能的排卵受孕日期，再加上 266 天
(C)等到第二孕期感受到胎動的日期，再加上 20~22 週
(D)以超音波觀察胚胎發育，例如：妊娠囊、胎心音
- 9 護理師執行腹部四段式操作法之主要目的為何？
(A)測子宮收縮強度 (B)測胎兒心跳 (C)檢查胎產式 (D)測子宮收縮頻率
- 10 懷孕 30 週婦女，主訴想強化骨盆肌肉群，下列產前運動之建議何者正確？①盤腿坐姿運動 ②凱格爾運動 ③蹲踞運動 ④膝胸臥式運動 ⑤腹肌收縮運動
(A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)②④⑤
- 11 陳女士 G₂P₁ 待產時發現胎位為枕後位，主訴腰酸疼痛，下列護理措施何者不適當？
(A)運用生產球膝跪姿有助於胎頭旋轉，減輕疼痛
(B)採站立弓箭步有助於胎頭旋轉，減輕疼痛
(C)按摩薦骨處，並請待產婦平躺，減輕疼痛
(D)冷熱敷骶骨處，減輕疼痛
- 12 有關待產婦呼吸技巧之敘述，下列何者錯誤？
(A)第一產程時，不須拘泥呼吸形態，只要待產婦覺得舒適即可
(B)建議呼吸技巧與其他舒適技巧並用
(C)出現迫切想用力時，可採用哈氣呼吸法
(D)待產婦若有換氣過度時，常因體內存留太多 CO₂，導致嘴唇或手指有麻刺感
- 13 當待產婦有下列何者描述時，可判斷為真陣痛的徵象？
(A)我剛剛坐著休息一下就好像沒那麼痛了 (B)我的子宮收縮痛的強度增加且越來越密
(C)我感覺到下腹部有子宮收縮痛 (D)我在走動時子宮收縮就沒那麼痛
- 14 有關第二產程的敘述，下列何者錯誤？
(A)胎頭下降壓迫薦椎和閉孔神經，使產婦有便意感
(B)建議採超過 10 秒閉氣用力法
(C)在第二產程的休息期時，不建議用力
(D)指子宮頸完全擴張到胎兒完全娩出的過程
- 15 下列何種胎位之生產時間通常較短？
(A) LOP (B) LOA (C) LSA (D) LMP
- 16 李女士 G₁P₀，子宮收縮每 2 分鐘一次，子宮頸口開 9 公分，變薄程度為 90%，先露部位高度為 0，產婦說：「我很痛，我要用力了」，此時的優先護理措施為何？
(A)通知麻醉醫師，告知產婦疼痛狀況 (B)教導平躺休息以避免子宮頸腫脹
(C)教導吹熄蠟燭式呼吸 (D)教導閉氣向下用力
- 17 蔡女士第一胎，子宮收縮每 2 分鐘一次，每次持續 60 秒，收縮強度為中度，子宮頸口開 8 公分，突然自然破水，羊水呈棕綠色，無晚期減速或變異性減速的情形。此時最優先的護理措施為何？
(A)內診評估子宮頸口變化 (B)監測子宮收縮
(C)測量體溫、脈搏、呼吸 (D)測量胎心率
- 18 有關產婦產後第 1 天的生理變化，下列敘述何者錯誤？
(A)白血球增多症 (leukocytosis) (B)凝血因子 (coagulation) 減少
(C)黃體素 (progesterone) 減少 (D)雌性素 (estrogen) 減少

- 19 張女士產後第一天，表示：「初乳黃黃黏黏的，聽說對嬰兒不好，等等我把它擠掉以後再餵奶。」，下列敘述何者正確？
- (A)初乳可以促進胎便排出，減少膽紅素再吸收，所以可以減少黃疸的機率
 - (B)初乳因為不含脂肪但含易消化吸收的乳糖，所以有利消化能力弱的新生兒
 - (C)初乳含豐富的抗體 IgM，可以保護新生兒不受病菌感染
 - (D)初乳含的維生素 K 雖然不如成熟乳多，但仍有防止出血的功用
- 20 李女士，哺餵母乳，產後出院前表示：「我暫時不想懷孕，想跟以前一樣吃避孕藥，可以考慮使用避孕器，其他方法就不用了。」，下列敘述何者最適當？
- (A)餵母乳期間不可以吃口服避孕藥，要改用保險套或是禁慾
 - (B)如果要吃避孕藥，需先禁慾，等接著的月經來潮後再開始吃
 - (C)如果要吃混合雌性素與黃體素的避孕藥，現在可以開始服用
 - (D)如果要子宮內避孕器，要等 4~6 週後返診時再置入
- 21 蔡女士 18 歲，表示：「我都用保險套避孕，前幾天跟我男友發生關係，忘記要用套子，可是我們不想懷孕。」，下列敘述何者最適當？
- (A)說明墮胎的方式與合併症，建議跟男友商量並繼續懷孕
 - (B) Mifepristone (RU486) 有拮抗黃體素的作用，可以用來避免懷孕
 - (C)因為還不確定懷孕，建議繼續觀察，確定懷孕後再決定如何處理
 - (D)在 72 小時內服用高劑量雌性素，12 小時後再服第二劑，可以用來避孕
- 22 有關新生兒飢餓的暗示行為，下列敘述何者錯誤？
- (A)寶寶的手伸向嘴巴並扭動身體
 - (B)臉部放鬆
 - (C)舌頭伸出來
 - (D)寶寶的臉轉向照顧者
- 23 婦女於正常陰道生產後的復舊生理變化，下列何者所需時間最長？
- (A)陰道皺襞
 - (B)心輸出量
 - (C)排尿量
 - (D)月經週期
- 24 白女士 G₂P₂，陰道生產後一週，此時惡露的評估正常為何？①白色 ②粉紅色 ③1 小時內產墊上的血液約為 5 公分 ④30 分鐘浸溼整片產墊
- (A)①③
 - (B)②④
 - (C)①④
 - (D)②③
- 25 白女士因胎兒窘迫接受剖腹生產，採腰椎硬膜外麻醉，有關於術後姿勢及其護理指導，下列何者最適當？
- (A)採垂頭仰臥式，有助呼吸道分泌物引流
 - (B)維持平躺 8 小時，避免腦脊髓液滲出
 - (C)採辛氏臥位頭側向一邊，避免分泌物阻塞呼吸道
 - (D)協助左側躺，以增加子宮的血液循環
- 26 下列那一個新生兒篩檢項目為檢測性聯染色體隱性遺傳疾病？
- (A)半乳糖血症
 - (B) G-6-PD 缺乏症 (蠶豆症)
 - (C)高胱胺酸尿症
 - (D)先天性甲狀腺低能症
- 27 有關新生兒髖關節脫臼的身體或姿勢表徵，下列何者錯誤？
- (A)大腿與臀部的股縫不對稱
 - (B)膝關節屈曲時患部的股骨較長
 - (C)歐特蘭尼徵象 (Ortolani's sign) 為陽性
 - (D)外展患部髖部動作時會受限且有阻力
- 28 聽診新生兒心跳速率的部位，下列何者正確？
- (A)左鎖骨內側第 2 至第 3 肋間交會點
 - (B)左鎖骨中線第 3 至第 4 肋間交會點
 - (C)左鎖骨內側第 3 至第 4 肋間交會點
 - (D)左鎖骨中線第 2 至第 3 肋間交會點

- 29 有關新生兒腸胃系統及排泄，下列敘述何者錯誤？
(A)新生兒出生後 3~4 天，體重會下降 5~10%，稱為生理性脫水
(B)新生兒出生後 12 小時內未解胎便，應通知小兒科醫師檢查
(C)出生 3~4 天後因哺餵母乳或配方奶的關係，會解出過渡便
(D)因新生兒賁門擴約肌未成熟，應避免餵食太飽
- 30 張女士，妊娠 8 週，因陰道斷續性少量出血到門診檢查。主訴有嚴重的噁心和嘔吐，醫師初步評估子宮大小超過懷孕週數，hCG 值偏高，超音波掃描未看到胎兒影像。張女士最可能的情况是：
(A)先兆性流產 (B)子宮外孕 (C)雙胞胎 (D)葡萄胎
- 31 王女士，懷孕 32 週，突然發生陰道出血而入院，醫囑住院安胎。評估個案未覺腹痛，出血呈鮮紅色、量中。護理師的處置與指導，下列何者錯誤？
(A)密切觀察生命徵象及出血狀況 (B)若安胎失敗，只能採剖腹生產
(C)評估與治療前，給予個案和家屬說明程序 (D)禁止執行陰道檢查
- 32 下列何者不適合使用麥角鹼類藥物（如 Ergonovine）來促進產後的子宮收縮？①妊娠糖尿病 ②前置胎盤 ③子癩前症 ④心臟疾病
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)②④
- 33 有關德國麻疹與懷孕關係，下列敘述何者錯誤？
(A)病毒藉由空氣及飛沫傳染 (B)德國麻疹疫苗是活的減毒疫苗
(C)孕婦應接種疫苗以避免感染 (D)妊娠初期感染會造成胎兒嚴重缺陷
- 34 陳女士因痛經求診，護理師的回答，下列何者最適當？
(A)可自行服用止痛藥 (B)可泡熱水澡以舒緩疼痛
(C)可多吃巧克力、咖啡等食物 (D)多休息，局部熱敷下腹部
- 35 鄭女士因骨盆腔炎症入院治療，下列敘述何者正確？
(A)護理指導安全性生活 (B)臥床休息，採側臥以利引流
(C)執行陰道灌洗，以保持清潔 (D)每天限液體 1,000 c.c.內
- 36 有關更年期婦女使用荷爾蒙補充療法的禁忌，下列何者錯誤？
(A)下肢靜脈血栓 (B)憂鬱症 (C)高血壓 (D)子宮頸原位癌
- 37 有關更年期婦女的護理指導，下列何者不適當？
(A)定期做子宮頸抹片檢查 (B)鈣攝取量增加至 500 mg/天，以預防骨質疏鬆
(C)減少高糖高油脂食物 (D)建議維生素 D 攝取 400 IU/天
- 38 下列何者不是預防新生兒臍帶感染的護理措施？
(A)沐浴前先用 95%的酒精消毒，再用 75%的酒精促進乾燥
(B)每次更換尿布時應注意臍帶是否有感染徵象
(C)包尿布時應保持尿布在臍部以下，避免尿液回滲
(D)臍帶尚未脫落前，應隨時保持臍部清潔乾燥
- 39 下列何者最可能與原發性月經疼痛相關？
(A)前列腺素 (B)子宮肌瘤 (C)卵巢腫瘤 (D)經血量過多
- 40 王女士 26 歲，結婚 2 年，因性交疼痛令其十分困擾而就診，下列護理措施何者錯誤？
(A)夫婦兩人一起討論以發掘彼此忽略的問題 (B)為顧及配偶自尊，治療初期以王女士為主
(C)探討病因期間建議王女士暫時禁慾 (D)必要時可鼓勵使用無刺激性的潤滑劑
- 41 有關 3 歲兒童的心肺復甦術之敘述，下列何者正確？
(A)執行心外按摩，以兩根手指按壓胸骨，深度為 4 公分
(B)檢查有無脈搏時，以肱動脈為主
(C)執行人工呼吸時，應同時罩住口、鼻，以防吹氣時漏氣
(D)胸部按壓與人工呼吸比例，單人施救應 30：2，雙人施救應 15：2

- 42 小強，5 歲，因溺水急救後送至急診，體溫為 29°C，下列處置何者錯誤？
(A)使用 40~45°C 加熱潮濕的氧氣 (B)由靜脈提供 40~42°C 的溫熱液體
(C)給予 40~45°C 電解液行胃灌洗 (D)給予加溫毯使體溫上升 3°C/小時
- 43 小剛，12 歲，國小六年級，因最近走路經常偏斜、跌倒，情緒變得暴躁，且經常遺忘事情而入院，經醫師檢查後，診斷為惡性腦瘤，母親情緒低落的說：「怎麼會這樣呢？小剛這麼乖，為什麼要讓他受這麼多折磨，我到底做錯了什麼？」，護理師最適當的處理為何？
(A)媽媽別難過，只要配合醫師，醫師一定會把孩子醫好的
(B)小剛這麼乖，這麼聽話，媽媽要有信心，上帝一定會幫助他的
(C)媽媽聽了醫師病情解釋後，心理一定非常傷心難過，如果想哭就哭出來
(D)人生有許多不如意的事，媽媽不要想太多
- 44 針對注意力不足／過動症 (attention deficit hyperactivity disorder, ADHD) 的行為表現與診斷之敘述，下列何者錯誤？
(A)容易分心精神無法集中 (B)過動及衝動行為持續 3 個月
(C)學齡兒童常見的發展性神經行為障礙之一 (D)重複一些被禁止的行為，企圖引他人注意
- 45 小莉，3 歲，因被熱湯潑及，處於燒燙傷急救期 (emergent period)，當小莉在低血量休克狀態下時，下列何者為最有效的止痛劑給予途徑？
(A)鼻部吸入 (B)皮下注射 (C)肌肉注射 (D)靜脈注射
- 46 美國精神疾病診斷準則手冊第五版 (DSM-5) 將自閉症、亞斯伯格症及未分類廣泛性發展障礙，統稱為自閉症類群障礙症 (autism spectrum disorder, ASD)，有關其身心表徵，下列何者錯誤？
(A)孤立的人際互動 (B)動作協調困難
(C)堅持固定的習慣或玩法 (D)語言和溝通能力障礙
- 47 有關兒童虐待的敘述，下列何者錯誤？
(A)遇到可疑的受虐兒，可撥打 110 或 113 專線 (B)1 歲以下嬰兒身上有任何的骨折，都須通報
(C)與受虐兒談話時，需協助指認及責怪施虐者 (D)施虐者大多是受虐兒熟識的身邊人占最多
- 48 有關為 4 歲的兒童進行身體檢查評估時，下列敘述何者最適當？
(A)測量耳溫時，應將該兒童的耳朵向下向後拉
(B)測量心尖脈的位置為左鎖骨中線與第五肋間交會點
(C)進行副鼻竇檢查時，首重出生時即存在且發育的額竇
(D)進行呼吸速率評估時，應注意該年齡為腹式呼吸
- 49 護理師為了讓 2~6 歲病童認為藥杯內藥物減少，將小藥杯改為較大底面積的藥杯，主要是運用兒童尚未發展何種認知概念？
(A)物體恆存 (B)質量保留 (C)象徵符號 (D)抽象邏輯
- 50 下列那個年齡層兒童，其繪畫發展已能充分表現創造性、具有平面及空間概念畫法？
(A)2~4 歲 (B)4~7 歲 (C)7~9 歲 (D)9~12 歲
- 51 依據皮亞傑 (Piaget) 的認知發展理論，感覺運動期 (sensory-motor stage) 的孩童，主要在建立何種概念？
(A)萬物有靈 (B)時間概念 (C)物體恆存 (D)抽象符號
- 52 餵食母乳之新生兒，可由母乳得到何種抗體，協助其對抗水痘、單純性疱疹與流行性感冒？
(A) IgA (B) IgD (C) IgE (D) IgG
- 53 早產兒的體溫調節功能不成熟，下列護理措施何者不適當？
(A)採集中護理，執行醫療照護時避免早產兒離開保溫箱
(B)低出生體重早產兒絕對不能執行袋鼠式護理，以免造成低體溫
(C)使用特殊透明膠膜覆蓋於加熱處理台 (warmer)，可以減少體熱散失
(D)早產兒抱出保溫箱時需要提供保暖，例如帽子、包被、手套

- 54 小衡，7 歲，因妥瑞氏症（Tourette's disorder），在學校常出現搖頭聳肩、發出狗叫聲，導致班上同學嘲笑，下列護理措施何者不適當？
- (A)疾病會影響智能發展，宜提供特殊教育
(B)評估小衡對疾病的認知程度，給予正向的心理支持
(C)教導小衡學會放鬆，減少因身體抽動導致疲倦的症狀
(D)教導家屬發掘小衡潛能或專長，以建立良好的自信心
- 55 小妮，1 歲半，診斷為蠶豆症（G-6-PD），有關此疾病之兒童與家庭壓力反應之護理措施，下列敘述何者最不適當？
- (A)應用聯合性遊戲溝通，以緩解其罪惡感
(B)盡量減少與父母分離以避免分離焦慮
(C)盡量維持小妮的日常生活作息與規範
(D)做任何治療時應使用簡潔的字句與小妮溝通
- 56 媽媽看到 2 歲大的小寶喝了一大口漂白水，應該如何立即處置再送醫？
- (A)先給小寶清水漱口
(B)先給小寶喝一點牛奶
(C)先幫小寶拍背讓他吐出來
(D)給予吐根糖漿引發嘔吐
- 57 有關護理師與癌症末期病童談論有關死亡的溝通方式，下列敘述何者最適當？
- (A)可鼓勵學齡期病童憑空想像死亡的意義
(B)避免與病童討論死亡議題
(C)提供病童遊戲和藝術，表達其想法與感受
(D)給予病童痊癒的希望
- 58 新生兒經母子垂直感染後天免疫缺乏症候群（AIDS），有關護理措施之敘述，下列何者錯誤？
- (A)執行侵入性治療時採取全面性防護措施
(B)鼓勵哺餵母乳以提升新生兒免疫能力
(C)可按時接種 B 肝疫苗
(D)不會透過唾液及碰觸帶原者所接觸的物體感染
- 59 有關麻疹與德國麻疹的臨床表徵之比較，下列何者正確？
- (A)麻疹會在口腔出現科氏斑點（Kopliks' spots）
(B)德國麻疹在紅疹消退後留下棕色色素沉著
(C)德國麻疹會出現咳嗽、結膜炎、鼻炎的症狀
(D)麻疹的疹子出現在淋巴腺腫大之後
- 60 幼兒感染腸病毒後的 5 天內，需要密切注意腸病毒的嚴重合併症狀，下列選項何者除外？
- (A)嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力
(B)無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮
(C)呼吸急促或心跳加快
(D)腸骨疼痛
- 61 有關氣喘病童使用吸入型氣喘藥物，下列敘述何者錯誤？
- (A)使用定量噴霧吸入劑（metered dose inhaler）時，應告訴病童閉氣 5~10 秒鐘
(B)乾粉吸入劑型（dry powder inhaler），建議適用於 5 歲以上之氣喘病童
(C)定量噴霧吸入劑（metered dose inhaler）的優點為劑量及副作用比口服少
(D)建議小於 10 歲兒童，使用定量噴霧吸入劑時併用面罩式吸藥輔助器（aerochamber）
- 62 小玲，9 歲，於扁桃腺切除術（tonsillectomy）後，用手指著傷口並抱怨傷口疼痛，下列護理措施何者最適當？
- (A)避免吃冰涼飲食，以免影響傷口癒合
(B)為緩解疼痛，依醫囑按時服用 Acetaminaphen
(C)建議小玲熱敷傷口，以降低腫脹減輕疼痛
(D)鼓勵喝檸檬汁或柳橙汁，以加速傷口癒合
- 63 張小妹，5 個月大，因肺部嚴重感染而住院，現有氣管內管留置，呼吸道分泌物黏稠，有關執行抽痰技能與應注意的事項，下列敘述何者正確？
- (A)應每小時執行抽痰，以有效排除呼吸道之分泌物
(B)抽痰順序：氣管內管→口腔→鼻腔
(C)抽痰管應在無抽吸壓力狀態下，放置到抽吸部位
(D)抽吸壓力應調在 110~130 mmHg

- 64 有關兒童毛地黃 (Digoxin) 給藥之護理指導, 下列敘述何者正確?
(A)給藥前測橈動脈 1 分鐘, 以監測心律不整
(B)給予口服糖漿時與牛奶併用, 增加服藥遵從性
(C)忘記給藥的時間如未超過 6 小時, 則補服一劑
(D)長期服用需補充奶類食物, 以預防低血鈣
- 65 小倫, 6 個月大, 患有法洛氏四重畸形 (Tetralogy of Fallot, TOF), 為維持心輸出量足夠身體所需之組織灌流的護理目標, 下列護理措施何者不適當?
(A)集中護理、安撫小倫情緒, 並減少哭泣
(B)避免便秘造成閉氣用力, 增加心臟負擔
(C)宜選用柔軟、吸食洞孔稍大的奶嘴餵奶
(D)每次餵食時間不宜太短, 應超過 30 分鐘
- 66 30 週早產之男嬰, 出生體重 1,500 公克, 診斷開放性動脈導管 (patent ductus arteriosus), 以 Indomethacin 靜脈注射治療, 下列敘述何者正確?
(A)尿量 $< 1 \text{ mL/kg/hr}$ 時應通知醫師調整藥物劑量
(B)治療前聽診較少出現心雜音
(C)因肺動脈血流下降易造成發紺
(D) Indomethacin 易造成血栓之副作用
- 67 阿強, 9 歲, 罹患 G-6-PD 缺乏症, 因全身黃疸住院治療, 有關此疾病之誘發因子, 下列敘述何者錯誤?
(A)最近是否吃蠶豆
(B)最近是否服用 Aspirin
(C)最近是否有使用樟腦丸
(D)最近是否服用止咳藥
- 68 有關鎌狀細胞貧血的敘述, 下列何者錯誤?
(A)紅血球變形呈鐮刀狀
(B)遺傳因子血紅素 S (Hgb S) 造成紅血球變形
(C)疼痛時可用 Aspirin 止痛
(D)經由體染色體隱性遺傳而來
- 69 小明, 3 歲, 罹患神經母細胞瘤, 進行第一次化學治療需要裝置人工血管, 有關人工血管的敘述, 下列何者不適當?
(A) Port-A 植入需要由外科醫師於手術室完成
(B) PICC 可由特別訓練護理師執行導管插入
(C) Port-A 每個月需要沖洗一次 10 mL (含 Heparine 100 U/mL) 生理食鹽水
(D) PICC 是最適合小明化學治療期間, 長期給藥的方式
- 70 化學治療期間血液檢查結果, 絕對嗜中性白血球 (absolute neutrophil count, ANC) 數目為 $320/\text{mm}^3$, 依據檢查結果, 下列護理指導何者較適當?
(A)教導個案 ANC 是確立白血病緩解與否的指標
(B)教導個案 ANC 的正常值會隨著年齡不同而改變
(C)教導個案注意預防感染, 需採保護性隔離措施
(D)教導個案可能出現自發性出血, 需要限制活動
- 71 小名, 14 歲, 因左膝尖銳性疼痛、腫脹入院, 醫師診斷為骨肉瘤 (osteosarcoma) 並進行截肢手術, 下列護理措施何者不適當?
(A)觀察殘肢是否有出血、滲液或發炎
(B)評估幻肢痛, 視需要使用藥物和神經阻斷法改善疼痛
(C)截肢術後立即以彈性繃帶固定殘肢, 以預防攣縮
(D)截肢術後立即裝置永久性義肢, 以減輕殘肢水腫
- 72 小花, 3 個月大, 診斷為先天性甲狀腺功能低下, 有關其疾病之臨床表徵, 下列敘述何者正確?
(A)肌肉張力強
(B)前凶門未閉合
(C)常有腹瀉情形
(D)皮膚乾粗

- 73 嬰兒唇顎裂手術後的護理照護注意事項，下列敘述何者錯誤？
(A)需適時約束嬰兒，手臂避免抓到縫線 (B)避免哭泣影響傷口，可使用安撫奶嘴安撫之
(C)直立式坐姿是較適合餵食的方式 (D)可用毛毯限制嬰兒翻身，避免嬰兒碰到傷口
- 74 王小弟，6 週大，每次餵奶後出現噴射式嘔吐，被診斷為幽門狹窄 (pyloric stenosis)，下列敘述何者正確？
(A)嘔吐物含膽汁，呈黃褐色 (B)嘔吐多發生在餵食完後
(C)上腹部出現由右至左慢慢移動的胃蠕動波 (D)大便含有血液與黏膜
- 75 小雄，2 歲，因嘔吐、體溫 38.6°C 而入院，母親主訴小雄昨日就開始嘔吐、解水樣綠色便多次，且進食量、尿量明顯減少，體重由 14 公斤降到 13.1 公斤。下列評估何者正確？
(A)無脫水現象 (B)輕度脫水現象
(C)中度脫水現象 (D)重度脫水現象
- 76 張小弟，10 歲，診斷為腎病症候群 (nephrotic syndrome)，目前服用 Prednisolone 治療，下列護理指導何者最適當？
(A)常見副作用是掉髮，建議以帽子或假髮修飾
(B)出現腸胃不適，先自行停藥，待症狀改善後再服用
(C)避免接觸有傳染病源的人或環境，以預防感染
(D)解血尿是藥物副作用所致，停藥後會改善
- 77 小芳，5 歲，罹患腦性麻痺 (cerebral palsy)，因咀嚼及吞嚥能力較差，導致進食量少，有關協助其進食的護理措施，下列敘述何者正確？
(A)提供高熱量、高蛋白質的流質食物，以增加進食量
(B)儘量將食物置放於舌頭後方
(C)膝蓋放鬆低於大腿，雙腳自然下垂
(D)不鼓勵小芳使用輔具學習獨立進食能力，以防噎到
- 78 小玉，3 歲，因原有腦室-腹膜分流管 (V-P shunt) 感染，已移除並接受腦室外引流 (external ventricular drainage) 手術，有關術後護理措施，下列敘述何者正確？
(A)引流時需完全平躺，以眼睛高度為壓力零點，嚴禁抬高床頭
(B)此裝置可配合測量顱內壓
(C)只能採取持續性引流，不可關閉引流管
(D)將腦脊髓液引流至一個半開放式的無菌收集瓶
- 79 陳小妹，於學校上體育課時，出現強直陣攣型痙攣 (tonic-clonic seizure) 發作，下列護理措施何者最不適當？
(A)壓額抬下巴，通暢呼吸道 (B)移開可能造成損傷的物品
(C)勿強行放置壓舌板於口內 (D)觀察並記錄發作型態與時間
- 80 王小妹，8 個月大，被診斷為熱性痙攣 (febrile convulsion)，下列敘述何者最適當？
(A)熱性痙攣通常會續發為癲癇的主要原因
(B)發作時呈現全身性或局部性痙攣型態
(C)痙攣發作時間通常持續 1 小時以上
(D)熱性痙攣發作後，常造成肢體偏癱或智能障礙等後遺症